

L'informazione è stata sensibilizzata sulle precauzioni necessarie
L'Ipla: "Eppure"Ma quest'anno gli insetti sono meno rispetto al 2018"

“Dopo la pioggia il rischio è la proliferazione delle larve”

ANALISI

FRANCA NEBBIA
NOVILIGURE

Un intervento tempestivo quello dell'Ipla (l'Istituto che gestisce per conto della Regione il progetto di lotta alle zanzare sul territorio regio-

nale) in seguito alla notizia della signora residente a Novi, colpita da Chikungunya, una malattia trasmessa da una zanzara infetta. «È stata trattata con prodotti adulticidi tutta la zona compresa nel raggio di circa 200 metri dall'abitazione della signora – dice Paolo Roberto, tecnico Ipla – inoltre abbiamo dato informazioni alla popolazione del circondario perché evitino il proliferare delle zanzare (primo consiglio non tenere contenitori d'ac-

qua all'aperto: le zanzare vi depositano le uova), ma abbiamo anche trattato prudenzialmente la zona intorno all'ospedale di Alessandria, dove la signora è passata». Una precauzione in più vista la ripresa della stagione calcistica allo stadio. A Novi si è pure intervenuti con trattamenti larvicidi nei tombini della città. La Chikungunya non è mortale, ma porta febbre, cefalee e artralgie, perché limita molto i movimenti

Uno dei consigli su cui i tecnici insistono è l'uso di repellenti se si sta all'aperto, per evitare contagi, specie in estate quando sono più frequenti viaggi e spostamenti verso Paesi dove ci sono specie di zanzare più a rischio. Ma ora, con l'annunciato calo delle temperature quale l'effetto sulle zanzare? «Bisognerà vedere come si comporterà il tempo nelle

prossime settimane – dice Roberto – certo la pioggia creerà pozzanghere in cui le zanzare deporranno uova e se le temperature ricominceranno a salire, ci sarà nuovamente infestazione di zanzare». Secondo l'Ipla la stagione attuale «è già stata gratificata da un rallentamento di comparsa di zanzare, grazie al freddo che ha caratterizzato il mese di maggio», dice Igor Boni, ad Ipla. «Se si fa il confronto con il 2018 il numero di zanzare è decisamente inferiore». In tutta la Regione e nel Casalese, una delle più estese per il progetto di lotta sono state predisposte un migliaio di ovitrappole e nelle zone dove è stata segnalata presenza di zanzara tigre (quella che più facilmente trasmette la Chikungunya, catturata con trappole per insetti adulti) si procede subito alla disinfestazione. —

© AVANTI! I DIRITTI RISERVATI

PAOLO ROBERTO
TECNICO
IPLA



È stata trattata tutta la zona compresa nel raggio di circa 200 metri dall'abitazione della paziente

Dopo questa pioggia se le temperature saliranno ci sarà una nuova infestazione

